

レジメンコード 010034
レジメン名称 ビキセオス (地固め療法)
投与間隔 35 日
備考 最大2コース

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 mL	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/袋] ビキセオス配合静注用 地固め療法 ビキセオス65ユニット (単位) /m ² (ダウノルビシン/シタラビンとして29/65mg/m ²) =====	500 mL 65 単位/m ²	
▼ 調製方法 ▼		
必要バイアル数を冷蔵庫から取り出し室温で30分静置 1バイアルを注射用水19mLで溶解 (5U (単位) /mL (ダウノルビシンとして2.2mg/mL)) 30秒ごとにゆっくりと上下反転を5分間 ゆるやかに渦をまくように回しながら完全に溶解 その後、室温で15分間静置 必要量を抜き取り生食500mLに希釈		
=====		
【調製後4時間以内に投与開始】		
○化学療法で実施		
③		
点滴時間 1時間30分		
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード 010034
 レジメン名称 ビキセオス（地固め療法）
 投与間隔 35 日
 備考 最大2コース

病日 3 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] ビキセオス配合静注用 地固め療法 ビキセオス65ユニット（単位）/m ² （ダウノルビシン/シタラビンとして29/65mg/m ² ） ===== ▼ 調製方法 ▼ 必要バイアル数を冷蔵庫から取り出し室温で30分静置 1バイアルを注射用水19mLで溶解 （5U（単位）/mL（ダウノルビシンとして2.2mg/mL）） 30秒ごとにゆっくりと上下反転を5分間 ゆるやかに渦をまくように回しながら完全に溶解 その後、室温で15分間静置 必要量を抜き取り生食500mLに希釈 ===== 【調製後4時間以内に投与開始】 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 65 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	