

レジメンコード 011008
 レジメン名称 APL97寛解導入療法01
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] イダマイシン注5mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 12 m g / m ²	

レジメンコード 011008
 レジメン名称 APL97寛解導入療法01
 投与間隔 14 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] イダマイシン注5mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 12 m g / m ²	

レジメンコード 011008
 レジメン名称 APL97寛解導入療法01
 投与間隔 14 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 011008
 レジメン名称 APL97寛解導入療法01
 投与間隔 14 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 011008
 レジメン名称 APL97寛解導入療法01
 投与間隔 14 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	