

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用 20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 45 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 1200 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用 1mg ○化学療法で実施 ④ — 以下余白 —	20 m L 1.3 m g / m ²	

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用 20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 45 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用 20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 45 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 1.3 m g / m ²	

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 9 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 mL 3000 単位/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 11 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 mL 3000 単位/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 13 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 1.3 m g / m ²	

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 16 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 18 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 3000 単位/m ²	

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 20 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 mL 3000 単位/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012001

レジメン名称 JALSG ALL-97 (60歳未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 22 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 1.3 m g / m ²	