

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 2 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 3 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	100 m L 300 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 4 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 50 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ — 以下余白 —	20 m L 2 m g	

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 11 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② — 以下余白 —	20 m L 2 m g	

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 12 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 13 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 012005

レジメン名称 Hyper-CVAD

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaにも使用

病日 14 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	