

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① ②開始30分前に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 22時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ①終了後投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 36時間後 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 42時間後 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 48時間後 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ② 前日④開始12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ ②終了後投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 54時間後 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 60時間後 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑥ ②開始12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 66時間後 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012006

レジメン名称 HD-MTX/Ara-C大量

投与間隔 14 日

備考 mantle cell lymphomaでも使用；MTX投与後48時間目に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 72時間後 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 78時間後 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	