

レジメンコード 012008

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法②⑥)

投与間隔 14 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 2-4 または DEXA (内服) 10mg/m² day 2-4、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] メソトレキセート点滴静注液 200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 50 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液 200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 23時間30分	500 mL 450 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012008

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法②⑥)

投与間隔 14 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 2-4 または DEXA (内服) 10mg/m² day 2-4、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 45 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③	20 m L 1.3 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ MTX投与開始36時間後に — 以下余白 —	15 m g / m ²	

レジメンコード 012008

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法②⑥)

投与間隔 14 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 2-4 または DEXA (内服) 10mg/m² day 2-4、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎	15 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎	15 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎	15 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎	15 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012008

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法②⑥)

投与間隔 14 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 2-4 または DEXA (内服) 10mg/m² day 2-4、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎	15 mg/m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎	15 mg/m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎	15 mg/m ²	
— 以下余白 —		