

レジメンコード 012009

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法④)

投与間隔 14 日

備考 6-MP (内服) 60mg/m²、PSL (内服) 60mg/m² day 1-4

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012009

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法④)

投与間隔 14 日

備考 6-MP (内服) 60mg/m²、PSL (内服) 60mg/m² day 1-4

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012009

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法④)

投与間隔 14 日

備考 6-MP (内服) 60mg/m²、PSL (内服) 60mg/m² day 1-4

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012009

レジメン名称 JALSG ALL97 (地固め・強化療法④)

投与間隔 14 日

備考 6-MP (内服) 60mg/m²、PSL (内服) 60mg/m² day 1-4

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		