

レジメンコード 012012

レジメン名称 Mature B ALL (prephase療法 ; L3))

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 1-5

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L 200 m g / m ²	

レジメンコード 012012

レジメン名称 Mature B ALL (prephase療法 ; L3))

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 1-5

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012012

レジメン名称 Mature B ALL (prephase療法 ; L3))

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 1-5

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012012

レジメン名称 Mature B ALL (prephase療法 ; L3))

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 1-5

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012012

レジメン名称 Mature B ALL (prephase療法 ; L3))

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 60mg/m² day 1-5

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		