

レジメンコード 012013

レジメン名称 Mature B ALL (レジメンA ; L3)

投与間隔 21 日

備考 DEXA (内服) 10mg/m<sup>2</sup> day 1-5、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] メソトレキセート点滴静注液 200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液 200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 23時間30分	500 m L 450 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード012013

レジメン名称 Mature B ALL (レジメンA ; L3)

投与間隔 21 日

備考 DEXA (内服) 10mg/m<sup>2</sup> day 1-5、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ②	20 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ MTX投与開始36時間後に  — 以下余白 —	15 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード012013

レジメン名称 Mature B ALL (レジメンA ; L3)

投与間隔 21 日

備考 DEXA (内服) 10mg/m<sup>2</sup> day 1-5、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に	15 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に	15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 6時間毎に	15 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 6時間毎に  — 以下余白 —	15 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード012013

レジメン名称 Mature B ALL (レジメンA ; L3)

投与間隔 21 日

備考 DEXA (内服) 10mg/m<sup>2</sup> day 1-5、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に	15 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に	15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 6時間毎に  — 以下余白 —	15 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 012013

レジメン名称 Mature B ALL (レジメンA ; L3)

投与間隔 21 日

備考 DEXA (内服) 10mg/m<sup>2</sup> day 1-5、MTX投与開始48時間に血中濃度測定

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 mL 50 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 mL 200 mg / m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		