

レジメンコード 012017

レジメン名称 フルダラビン単独療法 (CLL)

投与間隔 21 日

備考 初回投与は20mg/m²、2回目以降は25mg/m²。

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 25 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012017

レジメン名称 フルダラビン単独療法 (CLL)

投与間隔 21 日

備考 初回投与は20mg/m²、2回目以降は25mg/m²。

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 25 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012017

レジメン名称 フルダラビン単独療法 (CLL)

投与間隔 21 日

備考 初回投与は20mg/m²、2回目以降は25mg/m²。

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 25 mg / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012017

レジメン名称 フルダラビン単独療法 (CLL)

投与間隔 21 日

備考 初回投与は20mg/m²、2回目以降は25mg/m²。

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 25 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012017

レジメン名称 フルダラビン単独療法 (CLL)

投与間隔 21 日

備考 初回投与は20mg/m²、2回目以降は25mg/m²。

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 25 mg/m ²	
— 以下余白 —		