

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 1200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用 20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用 20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 8 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 15 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012018

レジメン名称 Ph+ALL208IMA寛解導入療法

投与間隔 42 日

備考

病日 22 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		