

レジメンコード 012025

レジメン名称 ベスポンサ (2-6コース目、4W) 【day1 ; 0.5mg/m<sup>2</sup>】

投与間隔 28 日

備考 投与30分前にカナール400mg、ホララミン2mg内服

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ベスポンサ点滴静注用1mg 1Vにつき注射用水4mLで溶解する ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	50 m L 0.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012025

レジメン名称 ベスポンサ (2-6コース目、4W) 【day1 ; 0.5mg/m<sup>2</sup>】

投与間隔 28 日

備考 投与30分前にカナール400mg、ホララミン2mg内服

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ベスポンサ点滴静注用1mg 1Vにつき注射用水4mLで溶解する ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	50 m L 0.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012025

レジメン名称 ベスポンサ (2-6コース目、4W) 【day1 ; 0.5mg/m<sup>2</sup>】

投与間隔 28 日

備考 投与30分前にカナール400mg、ホララミン2mg内服

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ベスポンサ点滴静注用1mg 1Vにつき注射用水4mLで溶解する ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	50 m L 0.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	