

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] メソトレキセート点滴静注液200mg[8mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg[8mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 23時間	500 m L 900 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑥終了後投与開始 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ`ッグ` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 前日④開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ ②開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑨終了後投与開始 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012033

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C1

投与間隔 30 日

備考 DA or PN day4-24

病日 4 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ ③終了後投与開始 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	