

レジメンコード 012036

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C1 (HdAC phase)

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 mL 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液 1g 「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 mL 2000 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 mL 100 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 mL	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液 1g 「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ ②開始12時間後に投与 点滴時間 3時間	500 mL 2000 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード 012036

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C1 (HdAC phase)

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ②開始12時間後に投与 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012036

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C1 (HdAC phase)

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ②開始12時間後に投与 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		