

レジメンコード 012501

レジメン名称 アーゼラ単独療法（1回目）

投与間隔 7 日

備考 前投薬：アセトアミノフェン400mg/day, ポララミン2mg/day

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] プレドニゾロンコハク酸エステルN a 注射用20mg「F」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] アーゼラ点滴静注液100mg[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 生理食塩液を用い希釈後の総量を1000mL 投与時間：0～30分 投与速度：12mL/h 投与時間：31～60分 投与速度：25mL/h 投与時間：61～90分 投与速度：50mL/h 投与時間：91～120分 投与速度：100mL/h 投与時間：121～150分 投与速度：200mL/h 投与時間：151～180分 投与速度：300mL/h 投与時間：181分～ 投与速度：400mL/h	985 m L 300 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	