

レジメンコード 012504

レジメン名称 Treakisym (B ; 100mg/m²、4W)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012504

レジメン名称 Treakisym (B ; 100mg/m²、4W)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] トレアキシシン点滴静注液100mg/4mL ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	