

レジメンコード 013001
 レジメン名称 ABVD療法（寛解導入）
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 | 100 m L 25 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L 1 瓶 | |
| 点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 100 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ⑤ | 50 m L 6 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間 | 500 m L 375 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 013001
 レジメン名称 ABVD療法（寛解導入）
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：2/2

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 | 100 m L 25 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L 1 瓶 | |
| 点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 100 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ⑤ | 50 m L 6 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間 | 500 m L 375 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |