

レジメンコード 014002

レジメン名称 CHOP療法

投与間隔 14 日

備考 PSL (内服) 50mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用 1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	