

レジメンコード 014004

レジメン名称 R-CHOP療法 (B cell lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服、PSL (内服) 50mg/m<sup>2</sup> day 3-7

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] リツキサ点静注500mg [50mL/B] ○化学療法で実施 ② = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00~30分 50mL/hr 30~60分 100mL/hr 60~90分 150mL/hr 90~120分 200mL/hr 120~150分 250mL/hr 150~180分 300mL/hr 180~210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00~30分 100mL/hr 30~60分 200mL/hr 60~90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 375 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 014004

レジメン名称 R-CHOP療法 (B cell lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服、PSL (内服) 50mg/m<sup>2</sup> day 3-7

病日 3 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	