

レジメンコード 014006

レジメン名称 THP-COP療法（高齢者または心疾患あり）

投与間隔 14 日

備考 PSL（内服） 30-50mg/m² day 1-5

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[5%100mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	