

レジメンコード 014008
 レジメン名称 DeVIC療法 (salvage)
 投与間隔 21 日
 備考 HBsAg、HCVAg陽性はDEXAなし

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 mL 100 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 mL 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 イホマイド投与と同時に 点滴時間 30分	50 mL 300 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 mL 300 mg / m ²	

レジメンコード 014008

レジメン名称 DeVIC療法 (salvage)

投与間隔 21 日

備考 HBsAg、HCVAg陽性はDEXAなし

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ イホマイド投与開始4時間後に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ イホマイド投与開始8時間後に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014008
 レジメン名称 DeVIC療法 (salvage)
 投与間隔 21 日
 備考 HBsAg、HCVAg陽性はDEXAなし

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 イホマイド投与と同時に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ イホマイド投与開始4時間後に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ イホマイド投与開始8時間後に 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014008

レジメン名称 DeVIC療法 (salvage)

投与間隔 21 日

備考 HBsAg、HCVAg陽性はDEXAなし

病日 3 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 イホマイド投与と同時に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ イホマイド投与開始4時間後に 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ イホマイド投与開始8時間後に 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	