

レジメンコード014011

レジメン名称 FND療法 (Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 10 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 2.5 瓶	

レジメンコード 014011

レジメン名称 FND療法 (Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 mL 25 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 mL 2.5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014011

レジメン名称 FND療法 (Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 2.5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014011

レジメン名称 FND療法 (Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 2.5 瓶	

レジメンコード 014011

レジメン名称 FND療法 (Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 2.5 瓶	