

レジメンコード014015

レジメン名称 MTX大量療法 (CNS lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 MTX投与開始後48時間、72時間に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 350 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 23時間	500 m L 3150 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014015

レジメン名称 MTX大量療法 (CNS lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 MTX投与開始後48時間、72時間に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ① MTX投与開始後36時間から  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014015

レジメン名称 MTX大量療法 (CNS lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 MTX投与開始後48時間、72時間に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ① 6時間毎に	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ② 6時間毎に	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ③ 6時間毎に	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ④ 6時間毎に  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード014015

レジメン名称 MTX大量療法 (CNS lymphoma)

投与間隔 14 日

備考 MTX投与開始後48時間、72時間に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ① 6時間毎に	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ② 6時間毎に	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ③ 6時間毎に  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	