

レジメンコード 014022

レジメン名称 FCM療法（再発Low grade lymphoma）

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 8 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014022

レジメン名称 FCM療法 (再発Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014022

レジメン名称 FCM療法 (再発Low grade lymphoma)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
— 以下余白 —		