

レジメンコード 014026
レジメン名称 DHAP療法
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014026
 レジメン名称 DHAP療法
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014026
 レジメン名称 DHAP療法
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014026
レジメン名称 DHAP療法
投与間隔 21 日
備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L 5 瓶	

レジメンコード 014026
レジメン名称 DHAP療法
投与間隔 21 日
備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L 5 瓶	