

レジメンコード 014027

レジメン名称 CHOP-E療法

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 40mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>ク</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分  - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 014027

レジメン名称 CHOP-E療法

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 40mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014027

レジメン名称 CHOP-E療法

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 40mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		