

レジメンコード 014028
 レジメン名称 HDMTX/HDAC
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 3000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 MTX投与終了後12時間後より6時間毎	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 6時間毎に 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014028
 レジメン名称 HDMTX/HDAC
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ ②開始12時間後に投与 点滴時間 1時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014028
レジメン名称 HDMTX/HDAC
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 6時間毎に 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014028
 レジメン名称 HDMTX/HDAC
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ②開始12時間後に投与 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 6時間毎に 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L 15 m g	