

レジメンコード 014029

レジメン名称 MVP

投与間隔 14 日

備考 塩酸プロカルバジン 100mg/m² day1-7(奇数サイクルのみ)

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 3000 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④	20 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ MTX投与終了後12時間後より6時間毎 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
- 以下余白 -		

レジメンコード 014029

レジメン名称 MVP

投与間隔 14 日

備考 塩酸プロカルバジン 100mg/m² day1-7(奇数サイクルのみ)

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014029

レジメン名称 MVP

投与間隔 14 日

備考 塩酸プロカルバジン 100mg/m² day1-7(奇数サイクルのみ)

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
— 以下余白 —		