

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g/m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ②開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ②開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g/m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 朝：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑧ 夕：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 朝：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラピン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 夕：12時間毎 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ①	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アセリオ静注液1000mgバッグ [100mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 15分 ②	500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ③	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後)リツキマブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■投与法 (2回目以降の投与、下記に該当する場合) ■ 初回投与時の副作用が軽微、臨床的に重篤な心疾患なし 末梢血リンパ球数5000/ μ L未満の場合 ===== 最初の30分で投与量 (液量) の20%を投与 その後60分で投与量 (液量) の80%を投与	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	