

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ② ①終了後50分後に投与開始 ■■■全量500mLとする■■■ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 6 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ③終了後2時間30分後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 30時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 36時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 42時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 6 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 48時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ②開始4時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ④終了後2時間30分後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 54時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ②開始8時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 60時間後 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 66時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 6 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 72時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ②開始4時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ④終了後2時間30分後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 78時間後 点滴時間 5分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ②開始8時間後に投与開始 点滴時間 5分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 MTX投与開始30時間後から6時間毎に投与 84時間後 点滴時間 5分 - 以下余白 -	50 m L 15 m g	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：8/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 10 日目

ページ数：9/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 12 日目

ページ数：10/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 14 日目

ページ数：11/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 16 日目

ページ数：12/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 18 日目

ページ数：13/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード 014036

レジメン名称 SMILE

投与間隔 28 日

備考

病日 20 日目

ページ数：14/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	250 m L 6000 単位/m ²	