

レジメンコード 014038
 レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アセリオ静注液1000mgバッグ [100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後)リツシマブBS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00~30分 50mL/hr 30~60分 100mL/hr 60~90分 150mL/hr 90~120分 200mL/hr 120~150分 250mL/hr 150~180分 300mL/hr 180~210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00~30分 100mL/hr 30~60分 200mL/hr 60~90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 014038

レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ベンタムスフィン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ト-ワ」 ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014038

レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ベンダムシフ塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ト-ワ」 ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	