

レジメンコード 014043  
 レジメン名称 G-B療法 (2サイクル目以降)  
 投与間隔 28 日  
 備考 G投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ガザイバ点滴静注1000mg [40mL/瓶] ○化学療法で実施 ② <b>■■投与法 (初回投与时：1日目) ■■■</b> 00～30分 12mL/hr 30～60分 25mL/hr 60～90分 37mL/hr 90～120分 50mL/hr 120～150分 62mL/hr 150～180分 75mL/hr 180～210分 87mL/hr 210分以降 100mL/hr <b>■■投与法 (2回目以降：8、15日目) ■■■</b> 00～30分 25mL/hr 30～60分 50mL/hr 60～90分 75mL/hr 90分以降 100mL/hr <b>■■投与法 (2コース目以降) ■■■</b> 00～30分 25mL/hr 30分以降 225mL/hr	210 m L 1000 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014043  
 レジメン名称 G-B療法 (2サイクル目以降)  
 投与間隔 28 日  
 備考 G投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ベンタムスフィン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL 「ト-ワ」 ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014043  
 レジメン名称 G-B療法 (2サイクル目以降)  
 投与間隔 28 日  
 備考 G投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ベンダムシフ塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ト-ワ」 ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  - 以下余白 -	50 m L	