

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② メイン 4時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ メイン 8時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホリ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管） 9時より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管） 10時に開始 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管） ⑤終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ メイン 12時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ メイン 16時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ メイン 20時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② メイン 4時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ メイン 8時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 10時に開始 点滴時間 1時間	250 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ メイン 12時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ メイン 16時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ メイン 20時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 24時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管) 10時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 12時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 14時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) 16時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管） ⑥終了後（18時）に投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管） ⑦終了後フラッシュ用 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 24時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管) 10時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 12時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 14時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) 16時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管） ⑥終了後（18時）に投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管） ⑦終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 24時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイワ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管) 10時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 12時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 14時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) 16時に開始 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管） ⑥終了後（18時）に投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管） ⑦終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 6 日目

ページ数：11/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② メイン 4時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ メイン 8時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 10時に開始 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤終了後（11時）に投与 点滴時間 3時間	500 m L 50 m g /kg	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 6 日目

ページ数：12/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥エンドキサンと同時 (11時) に投与 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ メイン 12時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑥終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管) ⑥エンドキサン投与4時間後 (15時) に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ メイン 16時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管) ⑥エンドキサン投与8時間後 (19時) に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	

レジメンコード014048
レジメン名称 MCEC
投与間隔 9 日
備考

病日 6 日目

ページ数：13/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ メイン 20時に開始 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 7 日目

ページ数：14/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② メイン 4時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ メイン 8時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) 9時より開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管) 11時に開始 点滴時間 3時間	500 m L 50 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤エンドキサンと同時 (11時) に投与 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 7 日目

ページ数：15/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ メイン 12時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑤終了後フラッシュ用 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑥エンドキサン投与4時間後（15時）に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ メイン 16時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管) ⑥エンドキサン投与8時間後（19時）に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ メイン 20時に開始 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 014048

レジメン名称 MCEC

投与間隔 9 日

備考

病日 8 日目

ページ数：16/16

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① メイン 0時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② メイン 4時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ メイン 8時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ メイン 12時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ メイン 16時に開始 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ メイン 20時に開始 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	