

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 1 日目 ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 ブスルフェクス点滴静注用60mg〔10mL/瓶〕 ■生食注意■（全量350mL超える場合は生食500mL使用） ■BU液量の10倍の生食に溶解（11倍希釈）■ BMI25以上の場合、標準体重を用いる ■■調製後8時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 3.2 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 2 日目 ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 ブスルフェクス点滴静注用60mg〔10mL/瓶〕 ■生食注意■（全量350mL超える場合は生食500mL使用） ■BU液量の10倍の生食に溶解（11倍希釈）■ BMI25以上の場合、標準体重を用いる ■■調製後8時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 3.2 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 3 日目 ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 ブスルフェクス点滴静注用60mg〔10mL/瓶〕 ■生食注意■（全量350mL超える場合は生食500mL使用） ■BU液量の10倍の生食に溶解（11倍希釈）■ BMI25以上の場合、標準体重を用いる ■■調製後8時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 3.2 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 4 日目 ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 ブスルフェクス点滴静注用60mg〔10mL/瓶〕 ■生食注意■（全量350mL超える場合は生食500mL使用） ■BU液量の10倍の生食に溶解（11倍希釈）■ BMI25以上の場合、標準体重を用いる ■■調製後8時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 3.2 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 5 日目 ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 リサイオ点滴静注液100mg〔2.5mL/瓶〕 最終濃度0.5～4.4mg/mL ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 5 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 6 日目 ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg〔2mL/B〕 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注〔250mL/袋〕 リサイオ点滴静注液100mg〔2.5mL/瓶〕 最終濃度0.5～4.4mg/mL ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 5 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）〔50mL/B〕 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 7 日目 ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 瓶	

レジメンコード014052
レジメン名称 BU+TT 自家末梢血幹細胞移植前
投与間隔 9 日
備考 BU：移植8日～5日前（day-8～day-5）、TT：移植4日～3日前投与（day-4、day-3）

病日 8 日目 ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 瓶	