

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 8 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 15 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 22 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 29 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014501
 レジメン名称 ジフォルタ
 投与間隔 49 日
 備考 ビタミンB12投与

病日 36 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ジフォルタ注射液20mg [1mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	