

レジメンコード 014502  
 レジメン名称 イストダックス  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イストダックス点滴静注用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014502  
 レジメン名称 イストダックス  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イストダックス点滴静注用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014502  
 レジメン名称 イストダックス  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イストダックス点滴静注用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	