

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 24時間	500 m L 9 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 0.4 m g	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 24時間	500 m L 9 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 0.4 m g	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 24時間	500 m L 9 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 0.4 m g	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 24時間	500 m L 9 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 0.4 m g	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L 5 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 9 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 10 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 11 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 12 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 17 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 18 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 19 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015001

レジメン名称 VAD療法（初回治療又はMP無効）

投与間隔 28 日

備考

病日 20 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	