

レジメンコード 015002  
 レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
 投与間隔 28 日  
 備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ②	20 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 2 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 3 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 4 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 9 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 10 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 11 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 12 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	



レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 17 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 18 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 mL 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 19 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	

レジメンコード 015002  
レジメン名称 ROAD療法（初発又はsalvage）  
投与間隔 28 日  
備考 L-PAM（内服） 8mg/m<sup>2</sup> day 1-6

病日 20 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 5 瓶	