

レジメンコード 015005
 レジメン名称 C-weekly (MP耐性)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② CPAは200~400mg/m ² で調整 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 015005
 レジメン名称 C-weekly (MP耐性)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② CPAは200~400mg/m ² で調整 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 015005
 レジメン名称 C-weekly (MP耐性)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② CPAは200~400mg/m ² で調整 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 015005
 レジメン名称 C-weekly (MP耐性)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② CPAは200~400mg/m ² で調整 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 400 m g / m ²	