

レジメンコード 015006

レジメン名称 ベルケイド (3week ; 再発又は治療抵抗性)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード 015006

レジメン名称 ベルケイド (3week ; 再発又は治療抵抗性)

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード 015006

レジメン名称 ベルケイド (3week ; 再発又は治療抵抗性)

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード 015006

レジメン名称 ベルケイド (3week ; 再発又は治療抵抗性)

投与間隔 21 日

備考

病日 11 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	