

レジメンコード 015010

レジメン名称 VD療法（皮下投与）3week 再発及び難治性

投与間隔 21 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 1 日目

ページ数：1/4

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| <p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p> | <p>1.3 mg/m² 5 mL</p> | |

レジメンコード 015010

レジメン名称 VD療法（皮下投与）3week 再発及び難治性

投与間隔 21 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 4 日目

ページ数：2/4

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| <p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p> | <p>1.3 mg/m² 5 mL</p> | |

レジメンコード 015010

レジメン名称 VD療法（皮下投与）3week 再発及び難治性

投与間隔 21 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 8 日目

ページ数：3/4

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| <p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p> | <p>1.3 mg/m² 5 mL</p> | |

レジメンコード 015010

レジメン名称 VD療法（皮下投与）3week 再発及び難治性

投与間隔 21 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 11 日目

ページ数：4/4

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| <p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p> | <p>1.3 mg/m² 5 mL</p> | |