

レジメンコード 015011

レジメン名称 VD療法（皮下投与）5week 再発及び難治性

投与間隔 35 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015011

レジメン名称 VD療法（皮下投与）5week 再発及び難治性

投与間隔 35 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015011

レジメン名称 VD療法（皮下投与）5week 再発及び難治性

投与間隔 35 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015011

レジメン名称 VD療法（皮下投与）5week 再発及び難治性

投与間隔 35 日

備考 DEX：20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	