

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 4 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP (皮下投与) (1-4サイクル ; 週2回)

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6~9mg/m²、プレドニゾロン 40~60mg/m² day1-4

病日 8 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射 (S C) [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 m g / m² 5 m L</p>	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 11 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 22 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 25 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 m g / m ² 5 m L	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 29 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015012

レジメン名称 VMP（皮下投与）（1-4サイクル；週2回）

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 32 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC）〔外来〕 後)ボルテゾミブ注射用3mg〔DSEP〕 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	