

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 9 m g / m ²	
皮下注射 (S C) [外来] 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] 後) ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ③	5 m L 1 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 9 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 9 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 9 m g / m ²	
皮下注射 (S C) [外来] 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ②	5 m L 1 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 8 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>5 mL 1 mg/m²</p>	

レジメンコード 015014

レジメン名称 iPAD

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg/day day1-2, 4-5, 8-9, 11-12

病日 11 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>5 mL 1 mg/m²</p>	