

レジメンコード 015018

レジメン名称 ERd 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 DEX 28mg day1, 8, 15, 22 (elo投与3-24hr前)、レリトミト day1-21

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① ①開始と同時に解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エムプリシティ点滴静注用300mg ○化学療法で実施 ③ <b>■■初回投与■■</b> 00～30分 0.5mL/分 (30mL/h) 30～60分 1.0mL/分 (60mL/h) 60分以降 2.0mL/分 (120mL/h) <b>■■2回目投与■■</b> 00～30分 3.0mL/分 (180mL/h) 30分以降 4.0mL/分 (240mL/h) <b>■■3,4回目投与■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入 <b>■■2コース目以降■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015018

レジメン名称 ERd 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 DEX 28mg day1, 8, 15, 22 (elo投与3-24hr前)、レリトミト day1-21

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① ①開始と同時に解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エムプリシティ点滴静注用300mg ○化学療法で実施 ③ <b>■■初回投与■■</b> 00～30分 0.5mL/分 (30mL/h) 30～60分 1.0mL/分 (60mL/h) 60分以降 2.0mL/分 (120mL/h) <b>■■2回目投与■■</b> 00～30分 3.0mL/分 (180mL/h) 30分以降 4.0mL/分 (240mL/h) <b>■■3,4回目投与■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入 <b>■■2コース目以降■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015018

レジメン名称 ERd 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 DEX 28mg day1, 8, 15, 22 (elo投与3-24hr前)、レリトミト day1-21

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① ①開始と同時に解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エムプリシティ点滴静注用300mg ○化学療法で実施 ③ <b>■■初回投与■■</b> 00～30分 0.5mL/分 (30mL/h) 30～60分 1.0mL/分 (60mL/h) 60分以降 2.0mL/分 (120mL/h) <b>■■2回目投与■■</b> 00～30分 3.0mL/分 (180mL/h) 30分以降 4.0mL/分 (240mL/h) <b>■■3,4回目投与■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入 <b>■■2コース目以降■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015018

レジメン名称 ERd 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 DEX 28mg day1, 8, 15, 22 (elo投与3-24hr前)、レリトミト day1-21

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① ①開始と同時に解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エムプリシティ点滴静注用300mg ○化学療法で実施 ③ <b>■■初回投与■■</b> 00～30分 0.5mL/分 (30mL/h) 30～60分 1.0mL/分 (60mL/h) 60分以降 2.0mL/分 (120mL/h) <b>■■2回目投与■■</b> 00～30分 3.0mL/分 (180mL/h) 30分以降 4.0mL/分 (240mL/h) <b>■■3,4回目投与■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入 <b>■■2コース目以降■■</b> 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分  — 以下余白 —	50 m L	