投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 1 日目

ページ数:1/6

	1	ページ数:1/6
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L	
点滴注射(D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 20 m g/m²	
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L	
一 以下余白 一		
	X펜션 I로 소) 나	

投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 2 日目

ページ数:2/6

<ul> <li>&lt;薬品名・用法&gt;</li> <li>点滴注射 (D I V)</li> <li>大塚生食注[250mL/袋]</li> <li>○化学療法で実施</li> <li>① 点滴時間 1時間</li> <li>点滴注射 (D I V)</li> <li>ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B]</li> <li>カイプロリス点滴静注用40mg</li> <li>○化学療法で実施</li> <li>② 点滴時間 30分</li> <li>点滴注射 (D I V)</li> <li>大塚生食注[250mL/袋]</li> <li>○化学療法で実施</li> <li>③ 点滴時間 1時間</li> <li>一 以下余白 一</li> </ul>	<用量> 250 mL 50 mL 20 mg/㎡	
<ul> <li>○化学療法で実施</li> <li>①</li> <li>点滴時間 1時間</li> <li>点滴注射 (D I V)</li> <li>ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B]</li> <li>カイプロリス点滴静注用40mg</li> <li>○化学療法で実施</li> <li>②</li> <li>点滴時間 30分</li> <li>点滴注射 (D I V)</li> <li>大塚生食注[250mL/袋]</li> <li>○化学療法で実施</li> <li>③</li> <li>点滴時間 1時間</li> </ul>	50 m L 20 m g/m²	
ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 	20 mg/m²	
大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 mL	
一 以下余白 一	 	

投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 8 日目

ページ数:3/6

<b>柄日 8 日目</b>		ペーシ数:3/6
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 mL	
点滴注射(D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g/m²	
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 mL	
<ul><li>以下余白 -</li></ul>		

投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 9 日目

ページ数:4/6

	T	
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 mL	
点滴注射(D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g/m²	
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L	
<ul><li>以下余白</li><li>一</li><li>以下余白</li></ul>		

投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 15 日目

ページ数:5/6

柄		ページ数: 5/6
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L	
点滴注射(D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g/m²	
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L	
一 以下余白 一		
		<b>学妹工匠房</b> 4.7.7.1

投与間隔 28 日

備考 DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

病日 16 日目

ページ数:6/6

		ペーシ数:6/6
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 mL	
点滴注射(D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g/m²	
点滴注射(D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 mL	
一 以下余白 一		