

レジメンコード 015024

レジメン名称 DL d 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 1ナリト`ミト` day1-21、DEX 20mg day2, 8, 9, 16, 22, 23

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	

レジメンコード 015024

レジメン名称 DL d 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 1ナリトミト day1-21、DEX 20mg day2, 8, 9, 16, 22, 23

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	