

レジメンコード 015026

レジメン名称 DB d 1コース目

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg day2, 4, 5, 9, 11, 12

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 1000mL◆ ■■投与方法(初回投与时)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr	1000 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④  - 以下余白 -	1.3 m g /m <sup>2</sup> 5 m L	

レジメンコード 015026

レジメン名称 DB d 1コース目

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg day2, 4, 5, 9, 11, 12

病日 4 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m<sup>2</sup> 5 mL</p>	

レジメンコード 015026

レジメン名称 DB d 1コース目

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg day2, 4, 5, 9, 11, 12

病日 8 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr	500 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④  — 以下余白 —	1.3 m g /m <sup>2</sup> 5 m L	

レジメンコード 015026

レジメン名称 DB d 1コース目

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg day2, 4, 5, 9, 11, 12

病日 11 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m<sup>2</sup> 5 mL</p>	

レジメンコード 015026

レジメン名称 DB d 1コース目

投与間隔 21 日

備考 DEX 20mg day2, 4, 5, 9, 11, 12

病日 15 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr  — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	