

レジメンコード 015030

レジメン名称 RVd lite

投与間隔 28 日

備考 レナリドミド15mg day1-21、DEX20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (76歳以上はday2, 9, 16を省略)

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m<sup>2</sup> 5 mL</p>	

レジメンコード 015030

レジメン名称 RVd lite

投与間隔 28 日

備考 レナリドミド15mg day1-21、DEX20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (76歳以上はday2, 9, 16を省略)

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射 (SC) [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m<sup>2</sup> 5 mL</p>	

レジメンコード 015030

レジメン名称 RVd lite

投与間隔 28 日

備考 レナリドミド15mg day1-21、DEX20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (76歳以上はday2, 9, 16を省略)

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m<sup>2</sup> 5 mL</p>	