

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 1000mL◆ ■■投与方法(初回投与时)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr	1000 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] 後) ボルテゾミブ注射用3mg [DSEP] 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④ - 以下余白 -	1.3 m g /m ² 5 m L	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 4 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 m g / m ² 5 m L	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 8 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与时)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与时)■■ 0~1時間 100mL/hr 1~2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr	500 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] 後) ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④ — 以下余白 —	1.3 m g /m ² 5 m L	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 11 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 15 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0~1時間 100mL/hr 1~2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 22 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0~1時間 100mL/hr 1~2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr	500 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] 後) ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④ — 以下余白 —	1.3 m g /m ² 5 m L	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 25 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 m g / m² 5 m L</p>	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 29 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0~1時間 100mL/hr 1~2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr	500 m L 16 m g /kg	
皮下注射 (S C) [外来] 後) ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ④ — 以下余白 —	1.3 m g /m ² 5 m L	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 32 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 015031

レジメン名称 D-VMP 1コース目

投与間隔 42 日

備考 MEL 9mg/m² day1-4、PSL 60mg/m² day2-4

病日 36 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 10分	50 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ③ 側管) ②投与開始1時間後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目投与時)■■ 0~1時間 50mL/hr 1~2時間 100mL/hr 2~3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(3回目以降投与時)■■ 0~1時間 100mL/hr 1~2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	